

ОТЗЫВ на автореферат диссертации

Алишлалова Саида Алигаджиевича «ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРОАНТРАЛЬНЫХ ПЕРФОРАЦИЙ И СВИЩЕЙ», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности — 3.1.7 Стоматология в Диссертационный Совет ПДС 0300.028 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Актуальность темы исследования

На сегодняшний день стоит отметить, что ороантральное сообщение является одним из наиболее распространенных осложнений хирургических вмешательств на верхней челюсти и, прежде всего, удаления моляров и премоляров. Также стоит подчеркнуть, что в последние годы ороантральное сообщение все чаще возникает после операций дентальной имплантации и синус-лифтинга. Формирование стойкого сообщения между полостью рта и верхнечелюстной пазухой сопровождается развитием хронического воспалительного процесса, нарушением функции верхнечелюстной пазухи, ухудшением качества жизни пациентов и создает значительные трудности при проведении последующего стоматологического лечения.

Несмотря на большое количество предложенных способов пластического устранения ороантральных сообщений, проблема остается далекой от окончательного решения. По данным отечественной и зарубежной литературы, частота рецидивов после хирургического лечения достигает 30 %, что свидетельствует об отсутствии универсальной методики, одинаково эффективной при различных клинических ситуациях.

Следует отметить, что автор не ограничился сравнительным анализом существующих методов пластики, а предложил собственный подход к лечению наиболее сложной категории пациентов — лиц с рецидивирующими ороантральными свищами и выраженным дефицитом местных тканей. Разработка метода пластического устранения дефекта с использованием свободного аутоотрансплантата из широкой фасции бедра представляет значительный научный интерес и имеет несомненную практическую ценность.

Таким образом, выбранная тема диссертационного исследования является своевременной, актуальной и полностью соответствует современным потребностям практической хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Научная новизна и практическая значимость

Соискателем впервые проведена сравнительная оценка методов пластики ороантральных перфораций и свищей с использованием трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей

ножке. Также стоит отметить, что впервые предложен метод устранения стойких и рецидивирующих ороантральных свищей с использованием аутоотрансплантата из широкой фасции бедра (АШФБ). Определены дифференцированные показания для использования методов пластики ороантральных перфораций и свищей трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке и пластики с использованием АШФБ.

Соискателем на основе сравнительного анализа определены дифференцированные показания для использования методов пластики ороантральных перфораций и свищей трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке, и пластики с использованием АШФБ, что в итоге повысит эффективность лечения данной патологии.

Научные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, являются внутренне непротиворечивыми, логически вытекают из представленных результатов исследования и полностью соответствуют поставленной цели и задачам.

Автором последовательно проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с ороантральными сообщениями с применением различных методов пластики, что позволило установить закономерности, определяющие эффективность закрытия дефектов. Показано, что ключевыми факторами успешного исхода являются адекватный объем пластического материала, надежная фиксация лоскута без натяжения, а также правильное расположение линии швов вне зоны дефекта. Особое внимание заслуживает проведенный анализ причин рецидивов ороантральных свищей, позволивший выделить наиболее значимые негативные факторы, к которым относятся дефицит местных тканей, рубцовые изменения после ранее выполненных оперативных вмешательств, а также нарушение кровоснабжения тканей в зоне пластики. Установленные закономерности имеют важное значение для практической хирургии и позволяют более обоснованно подходить к выбору метода оперативного вмешательства.

На основании полученных данных автором разработаны дифференцированные показания к применению различных методов пластического устранения ороантральных сообщений, что позволяет индивидуализировать хирургическую тактику и повысить эффективность лечения. Практические рекомендации, сформулированные в диссертации, логично вытекают из результатов исследования, обладают высокой степенью обоснованности и могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику.

Заключение

Диссертационное исследование Алишлалова Саида Алигаджиевича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи – повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами путем разработки дифференцированного подхода к выбору метода пластического закрытия дефекта, а также внедрения нового способа хирургического лечения рецидивирующих ороантральных свищей с использованием свободного аутотрансплантата из широкой фасции бедра. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного учёным советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Алишлалов Саид Алигаджиевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7 – Стоматология.

Профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и травматологии пропедевтики хирургической стоматологии стоматологического факультета НОИ стоматологии им. А.И. Евдокимова ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России. Доктор медицинских наук (3.1.7 – Стоматология).

М.Р. Абдусаламов

Подпись



Подпись доктора медицинских наук, профессора Абдусаламова М.Р. заверяю:

Ученый секретарь ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

11 сентября 2026 г.

Раснер Павел Ильич



Подпись

М.П.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4

Тел.: 8-495-607-67-00; e-mail: info@rosunimed.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Алишлалова Саида Алигаджиевича «Оптимизация хирургического лечения ороантральных перфораций и свищей», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности — 3.1.7 Стоматология в Диссертационный Совет ПДС 0300.028 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Алишлалова Саида Алигаджиевича посвящена решению актуальной научно-практической задачи на сегодняшний день, стоящей перед врачами-стоматологами-хирургами и челюстно-лицевыми хирургами – повышению эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами. В последние годы ороантральное сообщение все чаще возникает после операций дентальной имплантации и синус-лифтинга. В ряде случаев формирование стойкого сообщения между полостью рта и верхнечелюстной пазухой сопровождается развитием хронического воспалительного процесса, нарушением функции верхнечелюстной пазухи, ухудшением качества жизни пациентов и создает значительные трудности при проведении последующего стоматологического лечения.

Традиционные методы закрытия такие как: лоскуты по Лимбергу, трапециевидный лоскут, VPRF-лоскут, основанные на перемещении местных слизисто-надкостничных тканей, часто оказываются несостоятельными при рецидивирующих, инфицированных или крупных дефектах (более 1 см), а также у пациентов с атрофией альвеолярного отростка. В этом контексте поиск

альтернативных материалов, в частности свободных аутотрансплантатов, полностью оправдан.

В представленной работе автор провел сравнительным анализом существующих методов пластики, и предложил собственный подход к лечению наиболее сложной категории пациентов — лиц с рецидивирующими ороантральными свищами и выраженным дефицитом местных тканей. Разработка метода пластического устранения дефекта с использованием свободного аутотрансплантата из широкой фасции бедра представляет значительный научный интерес и имеет несомненную практическую ценность.

Таким образом, выбранная тема диссертационного исследования является своевременной, актуальной и полностью соответствует современным потребностям практической хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Научная новизна и практическая значимость

Соискателем впервые проведена сравнительная оценка методов пластики ороантральных перфораций и свищей с использованием трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке. Также стоит отметить, что впервые предложен метод устранения стойких и рецидивирующих ороантральных свищей с использованием аутотрансплантата из широкой фасции бедра (АШФБ). Определены дифференцированные показания для использования методов пластики ороантральных перфораций и свищей трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке и пластики с использованием АШФБ.

Соискателем на основе сравнительного анализа определены дифференцированные показания для использования методов пластики

ороантральных перфораций и свищей трапецевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке, и пластики с использованием АШФБ, что в итоге повысит эффективность лечения данной патологии.

Научные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, являются внутренне непротиворечивыми, логически вытекают из представленных результатов исследования и полностью соответствуют поставленной цели и задачам.

Автором последовательно проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с ороантральными сообщениями с применением различных методов пластики, что позволило установить закономерности, определяющие эффективность закрытия дефектов. Показано, что ключевыми факторами успешного исхода являются адекватный объем пластического материала, надежная фиксация лоскута без натяжения, а также правильное расположение линии швов вне зоны дефекта. Особое внимание заслуживает проведенный анализ причин рецидивов ороантральных свищей, позволивший выделить наиболее значимые негативные факторы, к которым относятся дефицит местных тканей, рубцовые изменения после ранее выполненных оперативных вмешательств, а также нарушение кровоснабжения тканей в зоне пластики. Установленные закономерности имеют важное значение для практической хирургии и позволяют более обоснованно подходить к выбору метода оперативного вмешательства.

На основании полученных данных автором разработаны дифференцированные показания к применению различных методов пластического устранения ороантральных сообщений, что позволяет индивидуализировать хирургическую тактику и повысить эффективность лечения. Практические рекомендации, сформулированные в диссертации, логично вытекают из результатов исследования, обладают высокой степенью

обоснованности и могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику.

Заключение

Диссертационное исследование Алишлалова Саида Алигаджиевича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи – повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами путем разработки дифференцированного подхода к выбору метода пластического закрытия дефекта, а также внедрения нового способа хирургического лечения рецидивирующих ороантральных свищей с использованием свободного аутоотрансплантата из широкой фасции бедра. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного учёным советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Алишлалов Саид Алигаджиевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7 – Стоматология.

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии,
стоматологической имплантации и
челюстно-лицевой хирургии

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

д-р. мед. наук, доцент (44.03.01 Анатомия человека)

«21» 09 2026 г.

М.Н. Дровосеков

ОТЗЫВ на автореферат диссертации
Алишлалова Саида Алигаджиевича «ОПТИМИЗАЦИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРОАНТРАЛЬНЫХ ПЕРФОРАЦИЙ И
СВИЩЕЙ», представленной на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук по специальности — 3.1.7 Стоматология в
Диссертационный Совет ПДС 0300.028 при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
(РУДН).

Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Алишлалова Саида Алигаджиевича посвящена решению актуальной научно-практической задачи на сегодняшний день, стоящей перед врачами-стоматологами хирургами и челюстно-лицевыми хирургами – повышению эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами. В последние годы ороантральное сообщение все чаще возникает после операций дентальной имплантации и синус-лифтинга. В ряде случаев формирование стойкого сообщения между полостью рта и верхнечелюстной пазухой сопровождается развитием хронического воспалительного процесса, нарушением функции верхнечелюстной пазухи, ухудшением качества жизни пациентов и создает значительные трудности при проведении последующего стоматологического лечения.

В различное время клиницистами предлагалось множество способов пластического устранения ороантральных сообщений, однако проблема остается далекой от окончательного решения. По данным отечественной и зарубежной литературы, частота рецидивов после хирургического лечения достигает 30 %, что свидетельствует об отсутствии универсальной методики, одинаково эффективной при различных клинических ситуациях.

Следует отметить, что автор не ограничился сравнительным анализом существующих методов пластики, а предложил собственный подход к лечению наиболее сложной категории пациентов — лиц с рецидивирующими ороантральными свищами и выраженным дефицитом местных тканей. Разработка метода пластического устранения дефекта с использованием свободного аутооттрансплантата из широкой фасции бедра представляет значительный научный интерес и имеет несомненную практическую ценность.

Таким образом, выбранная тема диссертационного исследования является своевременной, актуальной и полностью соответствует современным потребностям практической хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Научная новизна и практическая значимость

Соискателем впервые проведена сравнительная оценка методов пластики ороантральных перфораций и свищей с использованием трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке. Также стоит отметить, что впервые предложен метод устранения стойких и рецидивирующих ороантральных свищей с использованием аутоотрансплантата из широкой фасции бедра (АШФБ). Определены дифференцированные показания для использования методов пластики ороантральных перфораций и свищей трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке и пластики с использованием АШФБ.

Соискателем на основе сравнительного анализа определены дифференцированные показания для использования методов пластики ороантральных перфораций и свищей трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твердого неба на питающей ножке, и пластики с использованием АШФБ, что в итоге повысит эффективность лечения данной патологии.

Автором продемонстрировано, что ключевыми факторами успешного исхода являются надежная фиксация лоскута без натяжения, а также правильное расположение линии швов вне зоны дефекта. Особое внимание заслуживает проведенный анализ причин рецидивов ороантральных свищей, позволивший выделить наиболее значимые негативные факторы, к которым относятся дефицит местных тканей, рубцовые изменения после ранее выполненных оперативных вмешательств, а также нарушение кровоснабжения тканей в зоне пластики. Установленные закономерности имеют важное значение для практической хирургии и позволяют более обоснованно подходить к выбору метода оперативного вмешательства.

На основании полученных данных автором разработаны дифференцированные показания к применению различных методов пластического устранения ороантральных сообщений, что позволяет

индивидуализировать хирургическую тактику и повысить эффективность лечения. Практические рекомендации, сформулированные в диссертации, логично вытекают из результатов исследования, обладают высокой степенью обоснованности и могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику.


Заключение

Диссертационное исследование Алишлалова Саида Алигаджиевича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи – повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами путем разработки дифференцированного подхода к выбору метода пластического закрытия дефекта, а также внедрения нового способа хирургического лечения рецидивирующих ороантральных свищей с использованием свободного аутотрансплантата из широкой фасции бедра. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного учёным советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Алишлалов Саид Алигаджиевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7 – Стоматология.

Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор

(14.00.21 Стоматология)

25.09.2026



Байриков И.М.

Подпись члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора
Байрикова И.М. заверяю:



ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава
России, 443099, г. Самара, Чапаевская ул., 89. Тел.: +7 864 374-10-04\$ e-mail: ipo@samsmu.ru

ОТЗЫВ на автореферат диссертации

Алишлалова Саида Алигаджиевича «ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРОАНТРАЛЬНЫХ ПЕРФОРАЦИЙ И СВИЩЕЙ», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности —

3.1.7 Стоматология в Диссертационный Совет ПДС 0300.028 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Актуальность темы исследования

Ороантральное сообщение (ОАС) остаётся распространённым осложнением хирургических вмешательств на верхней челюсти, прежде всего после удаления моляров и премоляров; в последние годы ОАС всё чаще возникает после дентальной имплантации и синус-лифтинга. Формирование стойкого сообщения между полостью рта и верхнечелюстной пазухой нередко сопровождается хроническим воспалительным процессом, нарушением функции пазухи и создаёт значительные трудности при последующем стоматологическом лечении. Несмотря на большое число предложенных способов пластического устранения ОАС, частота рецидивов достигает 30 %, что свидетельствует об отсутствии универсальной методики. В связи с этим тема диссертационного исследования является своевременной и актуальной.

Научная новизна и практическая значимость

Автором впервые проведена сравнительная оценка методов пластики ОАС с использованием трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и языкообразного полнослойного слизистого лоскута с твёрдого нёба на питающей ножке. Впервые предложен метод устранения стойких и рецидивирующих ороантральных свищей с использованием аутоотрансплантата из широкой фасции бедра (АШФБ). На основе сравнительного анализа определены дифференцированные показания к применению каждого из методов, что повышает эффективность лечения данной патологии. Практическая значимость состоит в возможности индивидуализировать хирургическую тактику, снизить риск рецидивов и улучшить результаты лечения, особенно у пациентов с рецидивирующими свищами и дефицитом местных тканей.

Анализ содержания работы

Научные положения, выводы и практические рекомендации внутренне непротиворечивы, логически вытекают из результатов исследования и соответствуют поставленной цели и задачам. Автором установлено, что ключевыми факторами успешного исхода являются адекватный объём пластического материала, надёжная фиксация лоскута без натяжения и расположение линии швов вне зоны дефекта. Проведённый анализ причин рецидивов позволил выделить наиболее значимые негативные факторы: дефицит местных тканей, рубцовые изменения после ранее выполненных вмешательств и нарушение кровоснабжения тканей в зоне пластики. Практические рекомендации обладают высокой степенью обоснованности и могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику.

Заключение

Диссертационное исследование Алишлалова Саида Алигаджиевича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи – повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ороантральными перфорациями и свищами путем разработки дифференцированного подхода к выбору метода пластического закрытия дефекта, а также внедрения нового способа хирургического лечения рецидивирующих ороантральных свищей с использованием свободного аутоотрансплантата из широкой фасции бедра. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного учёным советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Алишлалов Саид Алигаджиевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7 – Стоматология.

Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Доктор медицинских наук, профессор

(14.01.17 Хирургия)

С.А. Епифанов

Подпись доктора медицинских наук, профессора Епифанова С.А. заверяю:

Ученый секретарь

Доктор медицинских наук, профессор

С.А. Матвеев

«14» 09 2026 г.

